

Аминка Фло

УСИЛЕННЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРБИЦИД СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ, ВСЕХ ВИДОВ ПАДАЛИЦЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА И РАПСА В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ И КУКУРУЗЫ



 410 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + 15 г/л флорасулама

 суспензионная эмульсия



АГРУСХИМ
АЛАБУГА



117452, Россия, Москва, Симферопольский бульвар, д.29, к.8
+7 (495) 287-85-36 www.s-ah.ru info@s-ah.ru



Имеет широкий спектр действия против однолетних и многолетних двудольных сорняков, в том числе проблемных (марь белая, амброзия, подмаренник, пикульник, ромашка, чистец болотный, дымянкa и другие), включая высокую эффективность против многолетних корнеотпрысковых сорняков (бодяк, осот);



Широкое «окно» применения – начиная от 3-х листьев до 2-го междоузлия на зерновых культурах;



Надежное решение для контроля резистентных двудольных видов и всех видов падалицы подсолнечника, рапса, амброзии, щирицы и других трудноконтролируемых видов двудольных;



Хорошо подавляет переросшие сорняки;



Работает даже при низких температурах (действует от +5°C);



Быстрый видимый эффект действия на сорняки, поэтому первые симптомы заметны уже через сутки после применения;



Нет ограничений для последующих культур

РЕГЛАМЕНТ

Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Норма расхода препарата, (л/га)	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
Зерновые колосовые культуры озимые и яровые (пшеница, ячмень, рожь, тритикале, полба), овес яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	0,3-0,5	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей)	60(1)
		0,5	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) у культуры. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей)	
Кукуруза, в том числе на силос и масло		0,3-0,5	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей)	



Канистра

5л



Срок годности

3 года

