

Ашинка ТРИО

ГЕРБИЦИД СИСТЕМОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ОДНОЛЕТНИМИ И МНОГОЛЕТНИМИ ДВУДОЛЬНЫМИ СОРНЯКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСТОЙЧИВЫМИ К 2,4-Д И МЦПА, В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И КУКУРУЗЫ



 2,4-Д к-ты (сложный 2-этилгексильный эфир), 300 г/л +
пиклорам, 51 г/л + флорасулам, 6,25 г/л

 суспензионная эмульсия



АГРУСХИМ
АЛАБУГА



117452, Россия, Москва, Симферопольский бульвар, д.29, к.8
+7 (495) 287-85-36 www.s-ah.ru info@s-ah.ru



Эффективен против большинства однолетних и многолетних двудольных сорняков.



Пиклорам позволяет увеличить эффективность комбинации как против однолетних двудольных, так и многолетних корнеотпрысковых сорняков, включая виды осота, мари, амброзии, вьюнок, горчак, подмаренник, падалицу подсолнечника (вт. ч. гибриды, устойчивые к трибенурон-метилу и имидазолинонам).



Контролирует нескольких «волн» падалицы подсолнечника.



Хорошо подавляет переросшие сорняки.



Отличается широким окном применения – начиная со стадии кущения до стадии образования второго междоузлия.



Предотвращение появления резистентности у сорных растений.

РЕГЛАМЕНТ

Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Норма расхода препарата, (л/га)	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой	Однолетние, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	0,4 – 0,6	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	60(1)
Кукуруза	Однолетние, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	60(1)



Канистра

5 л



Срок годности

3 года

