



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 5061 от « » 29 августа 2025 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Техноэкспорт», ОГРН 1125042005175 (взамен ранее выданных
свидетельств о государственной регистрации от 10 апреля 2018 г. № 1863

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Командор, ВРК (200 г/л имидаклоприда)
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 046-01-5061-1

на срок по «9» апреля 2028 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№ 005652

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20 (1)
0,2-0,25		Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней до и во время посадки. Расход рабочей жидкости - 10 л/т клубней (до посадки), 25 л/т клубней (во время посадки)	-(1)
0,5-1,5	Огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05%. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)
	Томат защищенного грунта			
2,0	Кукуруза (на зерно)	Проволочники	Обработка семян. Непосредственно перед посевом или заблаговременно до посева (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 12 л/т семян	- (1)
	Подсолнечник (кроме зеленой массы)			
1,0-1,5	Пшеница озимая и яровая	Хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи, проволочники	Обработка семян. Расход рабочей жидкости - 11,5 л/т семян	-(1)
0,2-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)
0,1-0,15	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обработанные весной. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)



Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1 мл/5л воды	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости-5 л/100м ²	20(1)
20-25 мл/воды		Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней до посадки. Расход рабочей жидкости-1 л/100 кг клубней	-(1)
5 мл/10л воды	Огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости-10 л/100 м ²	3(1)
	Томат защищенного грунта			3(1)
	Цветочные культуры открытого грунта	Тли, калифорнийский трипс		-(1)

Запрещается применение препарата в водоохранной зоне водных объектов, авиационным методом

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади, в том числе в личных подсобных хозяйствах для проведения механизированных работ– 3 дня.

Срок безопасного выхода в теплицу в том числе в личных подсобных хозяйствах для ручных работ – 1 день.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

