

Культура земледелия



technoexport-agro.ru

ПУЛЬМАКС, ВРК

120 г/л имазамокса

Гербицид широкого спектра действия для бобовых культур, сортов и гибридов рапса, устойчивых к имидазолинонам



- **высокая концентрация действующего вещества**
- **максимально широкий спектр действия (эффективное сдерживание осота желтого и пырея ползучего)**
- **двойное действие – через листья и корни чувствительных сорных растений**
- **надежная защита культуры в самую уязвимую фазу (начиная с 1-3 настоящих листьев)**
- **контроль второй «волны» сорняков при достаточной влажности**

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

г. Барнаул +7 (913) 239-64-85
г. Волгоград +7 (844) 252-01-81
г. Казань +7 (917) 916-08-86
г. Липецк +7 (474) 255-56-54
г. Оренбург +7 (353) 237-88-58

г. Ростов-на-Дону +7 (863) 303-63-45
г. Тимашевск +7 (861) 309-50-15
г. Саратов +7 (927) 134-79-86
г. Ставрополь +7 (968) 274-43-55
г. Челябинск +7 (902) 602-56-00

Согласно Свидетельству о государственной регистрации пестицида № 046-03-3693-1 от 23.05.2022 г.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
Горох (кроме овощного горошка)	0,25-0,35	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры.	52(1)
			В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам);	
Соя			на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам);	60(1)
Рапс яровой на семена и масло (гибриды, уст. к имидазолинонам)	0,3-0,4		через 2 года – овес, подсолнечник (традиционные сорта и гибриды); через 3 года – любые культуры без ограничений, включая традиционные сорта и гибриды рапса; свёклу сахарную.	57(1)
			Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей)	



technoexport-agro.ru



ПУЛЬМАКС, ВРК

120 г/л имазамокса



01.

Применять в 4-5 настоящих листьев у культуры, в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа)

02.

Заделывать и проводить междурядные культивации нежелательно в течение 2-4 недель, чтобы не нарушать гербицидный экран

03.

Для уничтожения трудноискоренимых сорняков (дурнишник, канатник, амброзия) на сое и горохе рекомендуется обработка баковой смесью с гербицидами на основе действующего вещества бентазон

04.

После внесения гербицида Пульмакс, ВРК нельзя применять препараты из группы имидазолинонов до конца вегетации культуры

05.

Однокомпонентные продукты из группы имидазолинонов должны применяться на одном поле не чаще, чем 1 раз в 3 года

06.

Оптимальная температура для применения гербицида — от +15 до +25°C

07.

Не рекомендуется применять гербицид в смесях с жидкими удобрениями и микроэлементами

ВНИМАНИЕ

На горохе с Пульмакс, ВРК **НЕЛЬЗЯ** **СОВМЕСТНО** применять **ПАВы**, которые могут смыть восковой слой (на основе этоксилата изоделилового спирта) или адьюванты, или препараты, способствующие проникновению действующего вещества через восковой слой, **например, фосфат эфир или фосфорорганические инсектициды**

